

***Bunias orientalis* L. – roripovník východný**

Oddelenie: Magnoliophyta

Trieda: Magnoliopsida

Rad: Brassicales

Čeľad': *Brassicaceae*



Fotodokumentácia: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

Opis druhu

Ide o dvojročnú až trvácú bylinu, dorastajúcu do výšky 25 – 120 cm. Jej stonka je v hornej časti bohato rozkonárená, s krátko stopkatými a bradavkovitými červenkastými žliazkami, väčšinou holá. Prízemné aj stonkové listy sú lýrovité, perovito laločnaté. Vyššie na stonke sú kopijovité, laločnaté a zúbkaté. Kvitne v máji až auguste svetložltými kvetmi, sústredenými v hustých súkvetiach (strapchoch). Plody sú nepukavé šešuľky, nepravidelne vajcovitého tvaru, nepravidelne hrboľaté, zúžené do zobáčika.

Pôvod


Pochádza z Arménskej vysočiny, z kade sa rozšíril do ostatných častí Ázie, napr. na Kaukaz, do Európy ale aj do Ameriky (pravdepodobne náhodne s osivom alebo dopravou).

Ekológia

Nemá vysoké nároky na podmienky stanovišťa, rastie v okolí železničných tratí, ciest, na medziach, ako burina na poliach, na lúkach, v okolí sídel. Rozširuje sa generatívne – semenami.

Rozšírenie v SR

V súčasnosti má roztrúsený výskyt v kotlinách Slovenska.



Metódy odstraňovania

Nakoľko ide prevažne o dvojročnú bylinu, je najvhodnejším spôsobom odstraňovania jej mechanické ničenie kosením. Plánovanie zásahu je potrebné sústrediť do obdobia pred kvitnutím druhu (najneskôr v čase kvitnutia druhu), aby sa zabránilo vysemeneniu a rozšíreniu na nové lokality. Biomasu je potrebné z lokality odstrániť.