

Helianthus tuberosus L. – snečnica hl'uznatá (topinambur)

Oddelenie: Magnoliophyta

Trieda: Magnoliopsida

Rad: Asterales

Čeľad': *Asteraceae*



Fotodokumentácia: Ing. Marta Múťňanová



Mgr. Katarína Sujová, PhD.

Opis druhu

Trvácna rastlina s podzemkovými hl'uzami, ktoré majú pri splanelých jedincoch vretenovitý tvar. Dorastá do výšky 60 až 250 cm. Stonky sú väčšinou priame, chlpaté, v hornej časti bývajú rozkonárené. Listy sú striedavé, vajcovité, na okraji pílkovité, na rubovej strane belavo páperisté. Úbory majú priemer 15 až 20 cm, sú žltej farby (terč je žltý, kvety žltkovo žlté). Druh kvitne v auguste až októbri.



Fotodokumentácia: Ing. Marta Múťňanová

Pôvod


Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol druh dovezený ako okrasná a úžitková rastlina, ktorá sa využívala na prikrmovanie zveri, ale aj ako zelenina.

Ekológia

Vyhovujú mu vlhkejšie výživné pôdy. Šíri sa vegetatívne – hl'uzami, ktoré sa postupne rozrastajú. Obl'ubujú ho diviaky, ktoré jeho hl'uzy vyrývajú a tým aj rozširujú na nové miesta.

Rozšírenie v SR

Vyskytuje sa už na väčšine územia Slovenska. Nájde ho na lesných okrajoch, čistinách, kde bol vysádzaný za účelom prikrmovania zveri (diviakov), v okolí vodných tokov, ale aj na iných prevažne nevyužívaných miestach.



Metódy odstraňovania

Využíva sa kosenie alebo mulčovanie niekoľkokrát ročne, čo oslabuje hľuzy, až kým postupne nevyhynú. Účinné je aj vykopávanie alebo vytrhávanie, ak ide o menšie porasty. Pri väčších plochách je možné použiť aj chemický spôsob, kedy sa porast postrieka herbicídny prípravkom na ničenie rastlín.

Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľko rokov za sebou!