

Škľabka ázijská (*Sinanodonta woodiana*)



<http://polovnictvo.pluska.sk/polovnictvo-rybarstvo/rybar/zivot-pri-vode/2011/cudzinka.html>

Introdukcia

V súvislosti s introdukciou východoázijských druhov rýb do Európy, na žiabrach amura, tolstolobikov, hrúzovca, možno aj tilapií.

Popis:

Škľabka ázijská má tenkostenné lastúry. Má takmer okrúhly tvar, dĺžku 120 až 180 a výšku 90 až 125 milimetrov. Na povrchu je hnedkastá až červenohnedá, vnútorná perleťová vrstva má ružovkasté sfarbenie, ktoré je intenzívnejšie pri mladých jedincov. Najspoľahlivejšie rozlišovacie znaky sú na vrchole lastúr. Kým naše druhy (škľabka riečna (*Anodonta anatina*), prípadne škľabka veľká (*A. cygnea*) tu majú drobné, rôzne tvarované „vrásky“, škľabka ázijská tu má päť výrazných, od seba oddelených valov.

Areál:

Pôvodne ázijská škľabka, do Európy bola pravdepodobne zavlečená vo forme lariev (glochídií), spolu s hostiteľskými rybami. Na našom kontinente ju prvýkrát zaznamenali v roku 1979 v Rumunsku. Rozšírila sa minimálne do ďalších 14 európskych krajín. Na Slovensku škľabku ázijskú prvýkrát zistil Košel (1995) v Dunaji pri Číčove, následne ju objavili v dolnom Ipli i Váhu, v Malom Dunaji, a dokonca aj v Dyji, prítoku Moravy pod Břeclavou. Známa je aj z viacerých lokalít na východnom Slovensku, napríklad v mŕtvom ramene Tisy.

Biotop:

Druh žije v stojatých alebo pomaly tečúcich vodách. Uprednostňuje vody s bahnitým dnom, často pomerne eutrofizované.

Spôsob života:

Patrí medzi mäkkýše s oddeleným pohlavím, rozmnožuje sa v lete. Samičkou vypustené larvy (glochídie) sa prichytávajú na žiabre rýb, ktoré sú ich hostiteľom.

Potrava:

Živí sa filtrovaním planktónu.