

Burunduk pruhovaný (*Tamias sibiricus*)

(zdroj: <http://www.cabi.org>)



Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

- *T. sibiricus* bol prvýkrát introdukovaný do Európy v roku 1970
- populácie sa usadili v miernych častiach strednej, južnej a severnej Európy vrátane Rakúska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska a Švajčiarska v prímestských lesoch a parkoch
- introdukovaný bol pred 20 rokmi aj na najväčší japonský ostrov Honšu
- môže spôsobovať škody na poľnohospodárskych plodinách a hrať dôležitú úlohu pri zvyšovaní rizika lymskej boreliózy.

Popis:

Malá pruhovaná veverička, váži asi 100 g. Sexuálny dimorfizmus je nevýrazný. Srst' je pieskovo hnedej farby, rovnako ako huňatý chvost s dvomi čiernymi bočnými pruhmi. Od hlavy k zadnej časti tela vedie 5 tmavých pozdĺžnych pruhov. Sfarbenie srsti závisí aj od geografického rozšírenia, v centrálnej Číne je horná časť hlavy sivá s mierne zvlneným vzorom.

Areál:

pokrýva obrovské územia v Európskej časti Ruska, severná hranica sa zhoduje z hranicou tajgy, východná a južná neprekračuje Volgu. V severovýchodnej časti Ďalekého východu obýva polostrovy Kamčatka a Čukotka. Žije pozdĺž celého pobrežia Ochotského a Japonského mora. Vyskytuje sa aj na Kórejskom polostrove a v niekoľkých provinciách Číny.

Biotop:

Hoci zaberá širokú škálu stanovišť, uprednostňuje niektoré typy lesov prevažne v tajge. Vyskytuje sa v rôznych ihličnatých lesoch s dostatkom mŕtveho dreva a bylinnej vegetácie. V Európe ho nájdeme v listnatých a ihličnatých lesoch a v mestských parkoch

Spôsob života:

Reprodukcia sa začína hneď po ukončení zimného spánku na začiatku marca. Samice môžu mať vo vrhu od 2 do 12 mláďat a plodnosť sa vekom zvyšuje. Mláďatá sa rodia holé a slepé a vážia 3 - 5 g.

Potrava:

Rastlinná strava v podobe púčikov, bobúľ, orechy, semená a huby, živočíšna – hmyz.