

Býčko piesočný (*Neogobius fluviatilis*)



Zdroj fotografie: http://www.hlasek.com/neogobius_fluviatilis1sk.html

Introdukcia a charakter inváznosti druhu

Do vnútrozemia Európy sa dostal prirodzenou cestou. Expanzia býčka piesočného nie je tak výrazná ako u ostatných druhov inváznych rýb.

Popis:

Pohlavnú dospelosť dosahuje v druhom roku života. Obdobie neresu prebieha od apríla do júla. Dorastá do veľkosti 15 až 18 cm (max. 25). Dožíva sa približne 5 rokov.

Areál:

Jeho pôvodný areál výskytu je v Čiernom, Azovskom a Marmarskom mori. Odtiaľ sa invazívne rozšíril do povodia Dunaja. Od roku 1970 je masívne rozšírený na Balatone. Od roku 1997 je evidovaný v centrálnej časti rieky Visla v Poľsku. V súčasnosti sa rozširuje na hornom toku Dunaja. Z územia Slovenska je býčko piesočné známe od roku 2001, kedy bol zaznamenaný v ústí Hrona do Dunaja.

Biotop:

Druh prosperuje v sladkovodných aj morských biotopoch. Obýva predovšetkým pobrežné plytčiny. Preferuje lokality so zárastom vodných rastlín a piesčité alebo bahnitý substrát dna do ktorého sa zvykne zahrabávať.

Spôsob života:

Jedná sa o bentický druh ryby obývajúci spodnú polovicu vodného stĺpca. Darí sa mu pri teplote v rozmedzí 4 – 20 °C. Neresí sa pri teplote vyššej ako 13°C. Výter prebieha v dávkach. Býčko piesočné je ikry ochraňujúci druh.

Potrava:

Živočišna. Živí sa najmä mäkkýšmi, kôrovcami, rybími ikrami i ich poterom, tiež larvami hmyzu.