

## *Conyza canadensis* (L.) Cronq. – turanec kanadský

**Oddelenie:** Magnoliophyta

**Trieda:** Magnoliopsida

**Rad:** Asterales

**Čeľad':** *Asteraceae*



Fotodokumentácia: Mgr. Katarína Sujová, PhD.

### **Opis druhu**

Jednoročná bylina dorastajúca do výšky 15 – 70 cm, s priamou, v hornej časti rozkonárenou, svetlozelenou, husto olistenou stonkou. Dolné listy sú kopijovité, slabo zubaté v hornej časti listu. Horné listy sú úzko kopijovité, celookrajné. Druh od júla do septembra vytvára drobné úbory valcovitého tvaru. Zákrov je viacradový so zelenými lysými listeňmi. Jazykovité kvety bielej farby sú len o niečo dlhšie ako zákrovné listene a viac menej zakrývajú žlté rúrkovité kvety. Plodom sú nažky s dlhým páperím, ktoré im umožňuje šírenie vetrom.

### **Pôvod**


Pôvodným areálom druhu je Severná Amerika (najmä oblasť USA a Južná časť Kanady). Do Európy sa dostal pravdepodobne náhodne už v dávnejšom období a rozšíril sa do väčšiny krajín.

### **Ekológia**

Druh je na podmienky prostredia nenáročný. Rastie aj v chudobných, suchých pôdach, v priemyselných a mestských oblastiach, v okolí vodných tokov, ciest, železníc, na okrajoch polí, rumoviskách a nevyužívaných plochách. Šíri sa výlučne generatívne, lebo produkuje postupne veľké množstvá semien, ktoré sú ľahko roznášané vetrom na veľké vzdialenosti.

### **Rozšírenie v SR**

Je rozšírený viac-menej na celom území Slovenska, s výnimkou vyšších pohorí.



### **Metódy odstraňovania**

Nakoľko ide o jednoročnú bylinu je najvhodnejším spôsobom odstraňovania jej mechanické ničenie kosením alebo mulčovaním porastov. Na okrajoch polí je možné aj zaoranie rastlín. Plánovanie zásahu je potrebné sústrediť výlučne do obdobia pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo vysemeneniu a rozšíreniu na nové lokality. Pokosenú biomasu je potrebné z lokality odstrániť, aby nedošlo k dozretiu semien aj na pokosených rastlinách.