

Korytnačka maľovaná (*Chrysemys picta*)



[http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Chrysemys_picta_dorsalis_\(aka\).jpg](http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Chrysemys_picta_dorsalis_(aka).jpg)

Introdukcia korytnačky maľovanej

- zámerný prenos ľuďmi
- teraristika, z chovov prenikla do voľnej prírody

Dovoz do Európskej únie a držba poddruhu korytnačka maľovaná bola zakázaná aj v zmysle zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES).

Popis:

Dorastá do veľkosti 25 cm, samce sú menšie, ale viac sfarbené. Majú hladký a plochý karapax (chrbát), ktorý má červené a žlté sfarbenie na čiernom alebo zelenočiernom pozadí, u niektorých je okraj panciera sfarbený do červena, na chrbte majú červený pruh alebo žlté či červené pásiky na krku.

Areál:

Je najrozšírenejším druhom severoamerickej vodnej korytnačky. Obýva pomaly tečúce vody od južnej Kanady po štáty Louisiana a severné Mexiko. Známe sú 4 poddruhy *C. picta belli*, *C. picta picta*, *C. picta marginata* a *C. picta dorsalis*.

Biotop:

Sladkovodný druh korytnačky. Žije v jazerách, rybníkoch a pomaly tečúcich potokoch a riekach s bahnitým dnom a hustým rastlinstvom bohatým na vodný hmyz a ryby.

Spôsob života:

Samica môže znášať tri znášky vajec za rok. Kladie 4 - 20 oválnych vajec na konci jari a začiatkom leta (máj až jún), ktoré zahrabáva do piesčitej pôdy. Mladé korytnačky sú takmer výhradne mäsožravé, všežravcami sa stávajú až postupne ako rastú. Samec dospieva v 3 rokoch, samica až v 7 rokoch. Počas zimy hibernuje zahrabaná v bahne na dne tokov. Dožíva sa až 55 rokov.

Potrava:

Všežravá, potravu si aktívne vyhľadá počas dňa, v noci spí na dne. Živí sa vodnou vegetáciou a rozmanitými vodnými živočíchmi, od hmyzu, kôrovcov až po ryby, vrátane ich vajíčok.

Príklady možnej variability kresby panciera druhu korytnačky maľovanej u jednotlivých poddruhov.

C.p. picta



C. p. marginata



C. p. dorsalis



C. p. bellii



http://sk.wikipedia.org/wiki/Korytna%C4%8Dka_ma%C4%BEOvan%C3%A1