

Mungo Geoffroyov (*Herpestes javanicus*)

(zdroj: <http://www.cabi.org>)



Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

- zámerne zavlečený druh na ostrovy Maurícius, Fidži, Havaj, Kuba, Chorvátsko, Barbados, Francúzka Guyana a ďalšie ostrovy
- pôvodne mal slúžiť na chytanie hlodavcov v trstinových plantážach
- problém predstavuje lov pôvodných druhov vtákov, cicavcov, plazov, ktoré predstavujú ľahšiu korisť ako hlodavce - spôsobuje vymieranie pôvodných druhov
- rozširuje choroby (besnota)

Popis:

Má štíhle telo s krátkymi nohami. Hlava je pretiahnutá so špicatým ňufákom. Chvost je robustný a postupne sa zužuje po celej dĺžke. Dosahuje dĺžku 50 – 67 cm, uši sú krátke a takmer ich nevidno. Srst' je krátka, na ktorej sú svetlo až tmavo hnedé škvrny. Spodná strana srsti je svetlejšia.

Areál:

Druh pochádza zo severnej časti Saudskej Arábie z Iránu, Iraku, Afganistanu, Indie, Nepálu, Barmy, Thajska, Malajzie, Laosu, Vietnamu a z južnej Číny.

Biotop:

Uprednostňuje suché stanovišťa na ktorých prevládajú trávne porasty a riedke lesy a kroviny. Nachádzame ho často aj pri ľudských príbytkoch. Rozdielne podmienky majú na ostrovoch, zatiaľ čo na Havaji dosahuje tento druh hustú populáciu, ktorá využíva aj vlhkejšie oblasti, na ostrove Maurícius ich môžeme nájsť v skalných štrbinách, vysokej tráve či trstinovej plantáži.

Spôsob života:

Môže sa rozmnožovať dva-tri krát do roka. Samice majú v jednom vrhu zvyčajne 3 mláďatá, ktoré pohlavne dospievajú v 10 mesiaci života a dožívajú sa 3-4 roky.

Potrava:

Všežravec, má veľmi pestrú stravu, ktorá sa skladá z drobných cicavcov, vtákov, bezstavovcov a rastlinného materiálu, ovocia.