

***Rudbeckia laciniata* L. – rudbekia strapatá**

Oddelenie: Magnoliophyta

Trieda: Magnoliopsida

Rad: Asterales

Čeľaď: *Asteraceae*



Fotodokumentácia: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.



Fotodokumentácia: Ing. Ján Terray

Opis druhu

Ide o trvácú bylinu s výškou 50 – 250 cm, s plazivým rozkonárujúcim sa podzemkom. Byľ je v hornej časti rozkonárená, holá. Listy vyrastajú striedavo, sú holé alebo riedko chlpaté a veľmi variabilné. Dolné a prostredné listy sú stopkaté, laločnaté, končisté, na okraji pílkovité. Horné listy sú sediace, nedelené, vajcovité. Kvitne od júla do septembra, prípadne októbra. Kvety sú usporiadané vo veľkých úboroch s priemerom 7 – 12 cm. Jazykovité kvety majú zlatožltú farbu, terčovité kvety sú výrazné, čierneho alebo zelenožltej farby. Plodom je holá nažka.

Pôvod


Druh pochádza zo Severnej Ameriky, z východnej a strednej časti USA a severovýchodu Kanady. Do Európy a na Slovensko bola dovezená ako okrasná rastlina.

Ekológia

Rastie na vlhších a humóznejších pôdach, v okolí vodných tokov, na narušených ruderalizovaných miestach, popri cestách, železničných tratiach, na lesných okrajoch. Rozmnožuje sa vegetatívne – rozrastaním a rozkonárovaním plazivých podzemkov.

Rozšírenie v SR

Výskyt druhu je zaznamenaný v okolí vodných tokov na juhu a východe Slovenska, ale aj v nižších polohách v západnej časti Slovenska.



Metódy odstraňovania

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie porastov druhu v období pred kvitnutím rastlín (najlepšie je opakovať kosenie viackrát ročne). Účinné je aj vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín, ak ide o menšie porasty. Môžeme využiť aj chemický spôsob s použitím herbicídneho prípravku, tzn. prípravku na ničenie rastlín, ktorým sa porast postrieka.